



ESTADO DE ALAGOAS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL
GABINETE DO DEPUTADO JAIRZINHO LIRA
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS - DEPUTADO MARCELO
VICTOR.

Asssembleia Legislativa de Alagoas



PROTOCOLO GERAL 730/2020
Data: 10/06/2020 - Horário: 11:59
Legislativo

Requerimento nº 30/2020/GDJL

Requerente: Deputado Jairzinho Lira

Assunto: Solicita o abono por falta do dia 12 de maio ao dia 05 de junho de 2020, em virtude de ter sido vítima do COVID-19, atendendo ao disposto no art. 76 c/c art. 74, II, do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

O DEPUTADO ESTADUAL JAIRZINHO LIRA, brasileiro, casado, autônomo, inscrito no CPF nº 043.203.244-47, serve-se do presente para solicitar o abono por falta do dia 12 de maio ao dia 05 de junho de 2020, em virtude de ter sido acometido pela COVID-19, conforme exame que segue, o qual, segundo as normas médicas, exigem que seu afastamento das funções seja por até 21 dias, atendendo ao disposto no art. 76 c/c art. 74, II, do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

Nestes termos.

Exora deferimento.

Maceió/AL, 07 de junho de 2020.


JAIRZINHO LIRA
Deputado Estadual

Nome.....: JAIR LIRA SOARES
Dr(a).....: Médico não identificado
Convênio...: PARTICULAR
Idade.....: 37 ano(s)
Envio.....: UNIDOR ARAPIRACA

Reg.: 001000456
Data: 12/05/2020
Prev. Entrega: 21/05/2020
Sexo: M
RG...:

Pág:1/1

EXAME

RESULTADO

Valor de Referência:

Sorologia para COVID-19

Anti-SARS-CoV-2, Anticorpos IgM

Reagente

Não Reagente: Inferior a 0,9 UA/mL

Anti-SARS-CoV-2, Anticorpos IgG

Não Reagente

Indeterminado: 0,9 a 1,0 UA/mL

Reagente: Superior ou igual a 1,1 UA/mL

Nota:

A dinâmica da resposta e produção de anticorpos durante os diferentes estágios da infecção pelo SARS-CoV-2 ainda não está totalmente estabelecida, portanto, os testes sorológicos devem ser interpretados com cautela.

Os testes imunológicos não devem ser utilizados como método de triagem em quadros suspeitos da COVID-19.

A pesquisa de anticorpos deve ser utilizada no diagnóstico da COVID-19, preferencialmente, na fase tardia após o início da doença. Menos de 40% dos pacientes têm anticorpos detectáveis durante os primeiros 7 dias do início dos sintomas.

Os anticorpos IgA e IgM mostram sensibilidade equivalente e o aparecimento de ambos no decurso da doença, em geral, ocorre em momentos concomitantes.

Um resultado NÃO REAGENTE por métodos sorológicos não descarta a possibilidade da COVID-19, principalmente nas fases iniciais da doença e não deve ser usado como a única base para decisão diagnóstica e para interrupção do isolamento.

Há relatos na literatura de reação cruzada com outros coronavírus, portanto, resultados REAGENTES podem ser devidos a infecção passada ou presente com cepas de coronavírus não-SARS-CoV-2, como os coronavírus HKU1, NL63, OC43 ou 229E.

Os resultados dos testes laboratoriais devem sempre ser considerados no contexto da clínica e dos dados epidemiológicos no estabelecimento do diagnóstico.

Material:Soro Manual

Método: Quimioluminescência

Arapiraca - AL., 12/05/2020 Hora : 21:18:02



Dr^a Rosa Maria Santos de Freitas
CRBM: 5828